

MV Abelhas

NOME	TITULAR AIM	Nº DA AIM	SUBSTÂNCIA ACTIVA 1	INTERVALO DE SEGURANÇA
Amicel Varroa Solução para tiras para colmeia	Laboratorios Maymó, S.A.	1197/01/18RFVPT	Amitraz.....25 mg	Mel: zero dias. Não utilizar durante o fluxo de mel.
API-Bioxal, 886 mg/g pó para uso em colmeias	CHEMICALS LAIF S.P.A.	929/01/15RFVPT	Ácido oxálico di-hidratado 886 mg (equivalente a 632,70 mg de anidro)	Mel: Zero dias Não colher o mel durante o período de tratamento.
APIGUARD 25% timol por tira para colmeia de abelhas do mel	Hifarmax, produtos e serviços veterinários, Lda	501/01/12NFVPT	Timol 25% p/p por 50 g de gel	Mel, zero dias Não utilizar antes ou durante a cresta.
APILIFE VAR tira para colmeias de abelhas	CHEMICALS LAIF S.P.A.	569/01/12RFVPT	Timol 8,00 g Óleo de eucalipto 1,72 g Cânfora racêmica 0,39 g Levomentol 0,39 g	Mel: Zero dias Não utilizar durante a produção do mel para evitar alteração do sabor do mel.
Apistan 0,8g / tira antiparasitária para colmeias	Hifarmax, produtos e serviços veterinários, Lda	500/01/12NFVPT	Tau- Fluvalinato a 10% w/w, ou seja, 800mg por banda de 8g	Mel, zero dias Não utilizar durante o fluxo de mel.
APITRAZ 500 mg tiras para colmeias de abelhas	CALIER PORTUGAL, S.A.	667/01/13DFVPT	Amitraz 500 mg	Mel: zero dias Não aplicar durante a produção do mel.
APIVAR 500 mg, bandas antiparasitárias para abelhas melíferas	QALIAN Portugal - Sociedade Comercial de Produtos Agropecuários Unipessoal, Lda.	564/01/12NFVPT	Barras com as dimensões 20x4x0,2 cm, impregnadas com o princípio activo:Amitraz 500 mg	Mel e outros produtos apícolas (polén, cera e propolis): zero dias
Dany's BienenWohl pó e solução para dispersão de 39,4 mg/ml para colmeias de abelhas melíferas	Dany Bienenwohl GmbH	S/ n.º de código	Ácido oxálico di-hidratado 17,5 g (equivalente a 12,5 g de ácido oxálico)	Mel: zero dias. Não utilizar durante o fluxo de mel.

NOME	TITULAR AIM	Nº DA AIM	SUBSTÂNCIA ACTIVA 1	INTERVALO DE SEGURANÇA
MAQS Ácido fórmico 68,2 g Tiras para colmeia para abelhas melíferas	NOD Europe Ltd	793/01/14RFVPT	Ácido fórmico: 68,2 g	Mel: Zero dias. Não colher o mel durante o período de tratamento de 7 dias.
Oxugar 5,7%, 41, mg/ml concentrado para solução para Abelhas	Andermatt BioVet GmbH	1054/01/16RFVPT	Ácido oxálico 41, mg (equivalente a 57,4 mg de Ácido oxálico di-hidratado)	Mel: zero dias, para colónias tratadas corretamente. Administrar o tratamento sem as alças colocadas.
Polyvar 275 mg tira para colmeia	Bayer Portugal, Lda.	1080/01/17DFVPT	Flumetrina 275 mg	Mel: Zero dias. Não aplicar durante o período de fluxo de mel.
THYMOVAR	Andermatt BioVet GmbH.	083/01/08RFVPT	Cada placa de colmeia contém:Substância activa: 15 g de timol Excipientes: 5,8 g de tela esponjosa de celulose	Mel: Zero dias. Não utilizar antes ou durante a cresta. Os favos de nidificação, que estejam presentes quando a colónia for tratada com o medicamento, não devem ser extraídos na Primavera seguinte.
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml suspensão para dispersão para colmeias de abelhas melíferas (1 frasco)	BeeVital GmbH	1095/01/17CFVPT	Ácido fórmico 5 mg Ácido oxálico di-hidratado 44 mg (equivalente a 31,42 mg de ácido oxálico anidro)	Mel: zero dias.
VarroMed 75 mg + 660 mg suspensão para dispersão para colmeias de abelhas melíferas	BeeVital GmbH	1095/02/17CFVPT	Ácido fórmico 75 mg Ácido oxálico di-hidratado 660 mg (equivalente a 471,31 mg de ácido oxálico anidro)	Mel: zero dias.